

PREFOAM +

AKTUALISIERUNGSDATUM: 07/01/26

**Gebrauchsfertige, ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehene
Flüssigkeit**

**EUTERHYGIENE VOR DEM MELKEN
DESINFEKTION DER ZITZEN DURCH SCHAUMAUFBRINGUNG**

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt: L-(+)-Milchsäure 2g +Salicylsäure 0,099g

Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer: N-106567

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im
Veterinärbereich

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aggregatzustand	Klare Flüssigkeit
Farbe	farblos
Geruch	Leichter Geruch
reiner pH-Wert	2,9±0,3
pH-Wert bei 10g/l	Nicht verfügbar
Dichte	1,011±0,01 g/cm ³
Gefrierpunkt	-1 °C

Eigenschaften :

- . PREFOAM + vereinigt den Wirkstoff LSA ® (aktiver Komplex aus Hydroxysäuren) mit Tensiden.
- . Der LSA ®-Komplex verleiht PREFOAM + eine zugleich schnelle und weitreichende bakterizide und levurozide Wirkung.
- . PREFOAM + enthält eine einzigartige Kombination tensidischer Substanzen, die leicht die Bildung eines Schaums zulassen, welcher zum einen sehr gut an Zitzen haftet und zum anderen leicht abgewischt werden kann.
- . Die im LSA ®-Komplex enthaltene Milchsäure und die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Propylenglykol tragen zur Geschmeidigkeit verleihenden Wirkung von PREFOAM + für die Haut bei.

Gebrauchsanweisung:

PREFORM + ist ein gebrauchsfertiges bakterizides und levurozides

Desinfektionsmittel für die Zitzendesinfektion vor dem Melken.

Schnell wirksam: Bakterizide Wirkung gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis

PREFOAM +

AKTUALISIERUNGSDATUM: 07/01/26

innerhalb von 30 Sekunden und levurozide Wirkung gegen Candida albicans innerhalb von 1 Minuten.

Vor der Anwendung des Mittels Zitzen von sichtbaren Verunreinigungen befreien.

Schaumbecher mit PREFOAM + füllen.

Vor dem Melken PREFOAM + durch Schaumaufbringung der Zitzen über die komplette Länge anwenden.

1 Minuten einwirken lassen.

Vor dem Anlegen des Melkzeugs Zitzen prinzipiell vorsichtig mit einem Einwegtuch oder einem wiederverwendbaren Eutertuch (ein Tuch pro Kuh) abwischen.

Bei jedem Melken anwenden.

Applikationsgeräte regelmäßig mit heißem Wasser reinigen

Kontrollparameter :

Bitte werden Sie sich bei Fragen zu den Kontrollparametern an Ihren Berater.

Verpackungen :

Kanister	0,5l	0,5kg	(Karton 4x5 kg)
Kanister	5l	5kg	
Kanister	10l	10kg	
Kanister	22l	20kg	
Fässchen	60l	60kg	
Fass	120l	120kg	
Fass	220l	200kg	
IBC	1000l	1000kg	

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, nicht in der Nähe von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

Qualität - Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.kersia-group.com>

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

Vorschrift

Dieses Produkt kann gemäß den geltenden Vorschriften im ökologischen Landbau verwendet werden.

PREFOAM +

AKTUALISIERUNGSDATUM: 07/01/26

PREFOAM + ist ein Gemisch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) unabhängig vom Herstellungsort, Die von der REACH-Verordnung betroffenen, in PREFOAM + enthaltenen Stoffe wurden von unserem Unternehmen oder den vorgelagerten Lieferanten vorregistriert oder registriert. PREFOAM + enthält keinen "besonders besorgniserregenden Stoff", der auf der aktuellen, von der ECHA veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten Kandidatenliste aufgeführt ist.

Wirksamkeit

Wirksamkeit	Norm	Getesteter Organismus / getestete Organismen	Störsubstanz/en	Kontaktzeit:	Temperatur:	Konzentration:
Bakterizid	EN 1656	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis	3 g/l Rinderalbumin	30Sekunden	30°C	50%
Levurizid	EN 1657	Candida albicans	3 g/l Rinderalbumin	1Min	30°C	87.5%
Viruzid	EN 14675	Modified vaccinia virus Ankara (MVA)	3 g/l Rinderalbumin	1Min	30°C	80%